

BOLLETTINO AGRONOMICO del 29 / 07 / 2021

FASE FENOLOGICA:

Da pre-indurimento del nocciolo a indurimento, a seconda della varietà e della zona.

INTERVENTI COLTURALI:

Per evitare competizione con l'olivo si consiglia di effettuare periodiche trinciature dell'erba prima che raggiunga lo stadio di fioritura della stessa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

- Cimice asiatica e cascola verde: i tecnici della Comunità Montana segnalano in tutte le zone monitorate la presenza di Cimice Asiatica, sia adulti che neanidi, oltre ad una pesante cascola verde delle drupe.
- Mosca dell'olivo: dal monitoraggio della mosca olearia, con trappole cromotropiche dislocate nei vari areali più rappresentativi si segnala l'aumento delle catture di adulti e la presenza di punture fertili nelle zone meglio esposte. Le temperature e l'umidità di questi giorni favoriscono sicuramente lo sviluppo dell'insetto con aumento dell'infestazione sulla scarsa produzione presente.

Per le aziende che attuano la lotta larvicida devono verificare la presenza di punture fertili e nel caso di superamento della soglia del 2-3% si consiglia un trattamento insetticida a base di Acetamiprid.

Per le aziende che attuano il controllo con repellenti (Caolino, Zeolite) e con esche repellenti (Spinosad) devono intervenire tempestivamente con il trattamento e ripeterlo in caso di dilavamento o allo scadere dell'efficacia.

Dove si attua la lotta con cattura massale, se non ancora posizionate si consiglia di installare tempestivamente i dispositivi, anche se in ritardo per controllare adeguatamente la generazione in atto.

- <u>Eventi grandinigeni</u>: è assolutamente consigliato intervenire tempestivamente anche se la produzione è limitata o nulla, per disinfettare le ferite e favorire la loro cicatrizzazione con prodotti rameici o Dodina abbinati a polveri di roccia (Zeolite).

Per particolari problematiche contattare i Tecnici della Comunità Montana al numero 030.986314 int.4 o all'indirizzo <u>uff.agricoltura@cmsebino.bs.it</u>

